

علاج الكيتونات و / أو أيام المرض (Ketone Treatment and/or Sick Days)

مستوى السكر في الدم أكثر من 250 أو الشعور بالمرض
يمكن لطفلي أن يأكل ويشرب

Blood sugar is more than 250 or Feeling Sick
My Child CAN Eat and Drink

الإنسولين	العلاج	الطعام والشراب	اختبار الكيتونات	اختبار مستوى السكر في الدم	مستوى الكيتونات
استمر في إعطاء الطعام والإنسولين طويل المفعول كالمعتاد	قم بمراقبة السكر في الدم وعلاج كالمعتاد. خلال فترة المرض، قد يعاني طفلك من ارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدل الطبيعي	خطة الوجبات المعتادة مع كمية كبيرة من المياه أو السوائل الخالية من السكر (أونصة واحدة على الأقل لكل عام من العمر لكل ساعة)	أفحص مستوى الكيتونات في كل مرة يدخل فيها الطفل إلى الحمام أو تقوم بتغيير الحفاض له (على الأقل كل 8 ساعات في حالة فحص الكيتونات في الدم)	الاختبار كالمعتاد (على الأقل كل 4 ساعات)	سلبى الكيتونات في البول (الكيتونات في الدم أقل من 0.6)
استمر في إعطاء الطعام والإنسولين طويل المفعول كالمعتاد	قم بإعطاء جرعة إنسولين تصحيحية كل ساعتين على أساس مستوى السكر في الدم الحالي	خطة الوجبات المعتادة مع كمية كبيرة من المياه أو السوائل الخالية من السكر (أونصة واحدة على الأقل لكل عام من العمر لكل ساعة)	أفحص مستوى الكيتونات في كل مرة يدخل فيها الطفل إلى الحمام أو تقوم بتغيير الحفاض له (كل 4 ساعات في حالة فحص الكيتونات في الدم)	كل ساعتين	ضئيلة للغاية - ضئيلة الكيتونات في البول (الكيتونات في الدم بين 0.6 و 1.5)
استمر في إعطاء الطعام والإنسولين طويل المفعول كالمعتاد	قم بإعطاء جرعة إنسولين تصحيحية كل ساعة على أساس مستوى السكر في الدم الحالي	خطة الوجبات المعتادة مع كمية كبيرة من المياه أو السوائل الخالية من السكر (أونصة واحدة على الأقل لكل عام من العمر لكل ساعة)	أفحص مستوى الكيتونات في كل مرة يدخل فيها الطفل إلى الحمام أو تقوم بتغيير الحفاض له (كل 2 ساعات في حالة فحص الكيتونات في الدم)	كل ساعة	متوسطة - كثيرة الكيتونات في البول (الكيتونات في الدم أكثر من 1.5)

حتى إذا كان مستوى السكر في الدم لديك أقل من 250، استمر في فحص الكيتونات واستخدام المخطط حتى تصبح الكيتونات سلبية.
إذا لم يتحسن مستوى الكيتونات بعد 3 حقن، فاتصل بالرقم 901-287-6659 للحصول على المساعدة

علاج الكيتونات و / أو أيام المرض (Ketone Treatment and/or Sick Days)

مستوى السكر في الدم أكثر من 250 أو الشعور بالمرض

لا يمكن لطفلي أن يأكل، لكنه يمكنه أن يشرب

**Blood sugar is more than 250 or Feeling Sick
My Child Can't Eat, but Can Drink**

مستوى الكيتونات	اختبار مستوى السكر في الدم	اختبار الكيتونات	السوائل	العلاج	الإنسولين
سلبية - ضئيلة الكيتونات في البول (الكيتونات في الدم بين 0.0 و 1.5)	كل 2 ساعات	افحص مستوى الكيتونات في كل مرة يدخل فيها الطفل إلى الحمام أو تقوم بتغيير الحفاض له (كل 4 ساعات في حالة فحص الكيتونات في الدم)	يجب شرب أونصة واحدة على الأقل من السوائل لكل عام من العمر في الساعة سكر الدم أقل من 250، يجب أن يحتوي ما يصل إلى كوب واحد (8 أونصات) من السوائل في الساعة على السكر، بينما يجب أن تكون باقي السوائل خالية من السكر سكر الدم أكثر من 250، يجب أن تكون كل السوائل خالية من السكر	قم بإعطاء جرعة إنسولين تصحيحية كل ساعتين على أساس مستوى السكر في الدم الحالي	استمر في إعطاء الإنسولين طويل المفعول كالمعتاد
متوسطة - كثيرة الكيتونات في البول (الكيتونات في الدم أكثر من 1.5)	كل ساعة	افحص مستوى الكيتونات في كل مرة يدخل فيها الطفل إلى الحمام أو تقوم بتغيير الحفاض له (كل 2 ساعات في حالة فحص الكيتونات في الدم)	يجب شرب أونصة واحدة على الأقل من السوائل لكل عام من العمر في الساعة سكر الدم أقل من 250، يجب أن يحتوي ما يصل إلى كوب واحد (8 أونصات) من السوائل في الساعة على السكر، بينما يجب أن تكون باقي السوائل خالية من السكر سكر الدم أكثر من 250، يجب أن تكون كل السوائل خالية من السكر	قم بإعطاء جرعة إنسولين تصحيحية كل ساعة على أساس مستوى السكر في الدم الحالي	استمر في إعطاء الإنسولين طويل المفعول كالمعتاد

إذا كنت تتقيأ ولديك كيتونات، أو لا يمكنك الشرب
اتصل بالطبيب أو الممرضة على الرقم 901-287-6659 أو توجه إلى غرفة الطوارئ

حتى إذا كان مستوى السكر في الدم لديك أقل من 250، استمر في فحص الكيتونات واستخدام المخطط حتى تصبح الكيتونات سلبية.
إذا لم يتحسن مستوى الكيتونات بعد 3 حقن، فاتصل بالرقم 901-287-6659 للحصول على المساعدة