

علاج الكيتونات و/أو أيام المرض أثناء استخدام المضخة (Pump Ketone Treatment and/or Sick Days)

مستوى السكر في الدم أكثر من 250 أو الشعور بالمرض

يمكن لطفلي أن يأكل ويشرب أثناء استخدام المضخة

Blood sugar is more than 250 or Feeling Sick

My Child Can Eat and Drink ON PUMP

مستوى الكيتونات	اختبار مستوى السكر في الدم	اختبار الكيتونات	الطعام والشراب	العلاج	الإنسولين
سلبي الكيتونات في البول (الكيتونات في الدم أقل من 0.6)	الاختبار كالمعتاد (على الأقل كل 4 ساعات)	أفحص مستوى الكيتونات في كل مرة يدخل فيها الطفل إلى الحمام أو تقوم بتغيير الحفاض له (كل 8 ساعات في حالة فحص الكيتونات في الدم)	خطة الوجبات المعتادة مع كمية كبيرة من المياه أو السوائل الخالية من السكر (أونصة واحدة على الأقل لكل عام من العمر لكل ساعة)	قم بمراقبة السكر في الدم وعلاج كالمعتاد. خلال فترة المرض، قد يعاني طفلك من ارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدل الطبيعي	استمر في جرعات وجبات الطعام كالمعتاد
ضئيلة للغاية - ضئيلة الكيتونات في البول (الكيتونات في الدم بين 0.6 و 1.5)	كل ساعتين	أفحص مستوى الكيتونات في كل مرة يدخل فيها الطفل إلى الحمام أو تقوم بتغيير الحفاض له (كل 4 ساعات في حالة فحص الكيتونات في الدم)	خطة الوجبات المعتادة مع كمية كبيرة من المياه أو السوائل الخالية من السكر (أونصة واحدة على الأقل لكل عام من العمر لكل ساعة)	قم بإعطاء جرعة إنسولين تصحيحية كل ساعتين على أساس مستوى السكر في الدم الحالي. *إذا لم ينخفض مستوى السكر في الدم بمقدار 50 نقطة على الأقل في خلال ساعة واحدة، فقم بإعطاء جرعة تصحيحية كاملة عن طريق الحقن مع تغيير الموقع	استمر في جرعات وجبات الطعام كالمعتاد قم بزيادة المعدل الأساسي بنسبة 20% مع استمرار تواجد كميات الكيتونات الضئيلة للغاية - الضئيلة
متوسطة - كثيرة الكيتونات في البول (الكيتونات في الدم أكثر من 1.5)	كل ساعة	أفحص مستوى الكيتونات في كل مرة يدخل فيها الطفل إلى الحمام أو تقوم بتغيير الحفاض له (كل 2 ساعات في حالة فحص الكيتونات في الدم)	خطة الوجبات المعتادة مع كمية كبيرة من المياه أو السوائل الخالية من السكر (أونصة واحدة على الأقل لكل عام من العمر لكل ساعة)	قم بإعطاء جرعة إنسولين تصحيحية كل ساعة على أساس مستوى السكر في الدم الحالي *إذا لم ينخفض مستوى السكر في الدم بمقدار 50 نقطة على الأقل في خلال ساعة واحدة، فقم بإعطاء جرعة تصحيحية كاملة عن طريق الحقن مع تغيير الموقع	استمر في جرعات وجبات الطعام كالمعتاد قم بزيادة المعدل الأساسي بنسبة 50% مع استمرار تواجد كميات الكيتونات المتوسطة - الكثيرة

حتى إذا كان مستوى السكر في الدم لديك أقل من 250، استمر في فحص الكيتونات واستخدام المخطط حتى تصبح الكيتونات سلبية. إذا لم يتحسن مستوى الكيتونات بعد 3 حقن، فاتصل بالرقم 901-287-6659 للحصول على المساعدة

علاج الكيتونات و/أو أيام المرض أثناء استخدام المضخة (Pump Ketone Treatment and/or Sick Days)

**مستوى السكر في الدم أكثر من 250 أو الشعور بالمرض
لا يمكن لطفلي أن يأكل، لكنه يمكنه أن يشرب أثناء استخدام المضخة**
**Blood sugar is more than 250 or Feeling Sick
My Child Can't Eat, but Can Drink ON PUMP**

مستوى الكيتونات	اختبار مستوى السكر في الدم	اختبار الكيتونات	السوائل	العلاج	الإنسولين
سلبية - ضئيلة الكيتونات في البول (الكيتونات في الدم بين 0.0 و 1.5)	كل 2 ساعات	افحص مستوى الكيتونات في كل مرة يدخل فيها الطفل إلى الحمام أو تقوم بتغيير الحفاض له (كل 4 ساعات في حالة فحص الكيتونات في الدم)	يجب شرب أونصة واحدة على الأقل من السوائل لكل عام من العمر في الساعة سكر الدم أقل من 250، يجب أن يحتوي ما يصل إلى كوب واحد (8 أونصات) من السوائل في الساعة على السكر، بينما يجب أن تكون باقي السوائل خالية من السكر سكر الدم أكثر من 250، يجب أن تكون كل السوائل خالية من السكر	قم بإعطاء جرعة إنسولين تصحيحية كل ساعتين على أساس مستوى السكر في الدم الحالي *إذا لم ينخفض مستوى السكر في الدم بمقدار 50 نقطة على الأقل في خلال ساعة واحدة، فقم بإعطاء جرعة تصحيحية كاملة عن طريق الحقن مع تغيير الموقع	قم بزيادة المعدل الأساسي بنسبة 20% مع استمرار تواجد كميات الكيتونات الضئيلة للغاية - الضئيلة
متوسطة - كثيرة الكيتونات في البول (الكيتونات في الدم أكثر من 1.5)	كل ساعة	افحص مستوى الكيتونات في كل مرة يدخل فيها الطفل إلى الحمام أو تقوم بتغيير الحفاض له (كل 2 ساعات في حالة فحص الكيتونات في الدم)	يجب شرب أونصة واحدة على الأقل من السوائل لكل عام من العمر في الساعة سكر الدم أقل من 250، يجب أن يحتوي ما يصل إلى كوب واحد (8 أونصات) من السوائل في الساعة على السكر، بينما يجب أن تكون باقي السوائل خالية من السكر سكر الدم أكثر من 250، يجب أن تكون كل السوائل خالية من السكر	قم بإعطاء جرعة إنسولين تصحيحية كل ساعة على أساس مستوى السكر في الدم الحالي *إذا لم ينخفض مستوى السكر في الدم بمقدار 50 نقطة على الأقل في خلال ساعة واحدة، فقم بإعطاء جرعة تصحيحية كاملة عن طريق الحقن مع تغيير الموقع	قم بزيادة المعدل الأساسي بنسبة 50% مع استمرار تواجد كميات الكيتونات المتوسطة - الكبيرة

إذا كنت تتقيأ ولديك كيتونات، أو لا يمكنك الشرب
اتصل بالطبيب أو الممرضة على الرقم 901-287-6659 أو توجه إلى غرفة الطوارئ

حتى إذا كان مستوى السكر في الدم لديك أقل من 250، استمر في فحص الكيتونات واستخدام المخطط حتى تصبح الكيتونات سلبية.
إذا لم يتحسن مستوى الكيتونات بعد 3 حقن، فاتصل بالرقم 901-287-6659 للحصول على المساعدة