


علاج الكيتونات باستخدام مضخة الإنسولين و/أو إرشادات العناية في أيام المرض

إذا كانت نسبة السكر في الدم أو قراءة مستشعر الجلوكوز أعلى من 250 (بعد مرور ساعتين على الأقل من تناول آخر وجبة) أو إذا كنت تشعر بتعب، فتتحقق من وجود الكيتونات واتبع التعليمات أدناه:

تأكد أن مضخة الإنسولين في الوضع التلقائي قبل اتباع التعليمات أدناه



إذا كنت تشعر بتعب: فاستمر في فحص نسبة الكيتونات كل 4 ساعات، حتى لو كانت النتيجة سلبية (وكل 8 ساعات خلال النوم إذا كانت نتيجة الكيتونات سلبية)

متى تتصل بخط الطوارئ (901-287-6659)

- إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في تشغيل الوضع التلقائي أو غير قادر على استخدامه
- إذا لم يظهر تحسن في نسبة الكيتونات بعد تلقي علاجين
- إذا كنت تعاني القيء أو الإسهال أو صعوبة في الأكل أو الشرب مع وجود الكيتونات
- إذا كان مستوى السكر في الدم أقل من 150 مع وجود الكيتونات